

## GLASGOW COMA SCORE

<b>Apertura degli occhi</b>	spontaneamente	<b>4</b>
	alla parola	<b>3</b>
	al dolore	<b>2</b>
	non apre gli occhi	<b>1</b>

<b>Risposte verbali</b>	orientata, cioè il paziente relaziona con l'ambiente, capisce e risponde	<b>5</b>
	confusa	<b>4</b>
	parole non appropriate, parole a casaccio, urla, bestemmia, cose insensate, anche se pronunciate bene	<b>3</b>
	suoni incomprensibili, per esempio farfuglia	<b>2</b>
	nessuna	<b>1</b>

<b>Risposte motorie</b>	obbedisce ai comandi	<b>6</b>
	localizza il dolore, se non vi è risposta ai comandi si applica uno stimolo doloroso che viene mantenuto finché non si abbia il massimo della risposta: inizialmente si applica la pressione al letto ungueale con il risultato di estensione o flessione del gomito; se vi è una di queste risposte allora lo stimolo viene effettuato al collo o al tronco per ricercare la "localizzazione" che si intende effettuata quando gli arti si muovono per tentare di rimuovere lo stimolo doloroso.	<b>5</b>
	si retrae, flette normalmente ma non localizza il dolore.	<b>4</b>
	Anormale flessione allo stimolo doloroso (decorticazione)	<b>3</b>
	Estensione allo stimolo doloroso, si ha quando la risposta è in adduzione delle braccia, rotazione interna e pronazione dell'avambraccio nel modello stereotipato della decerebrazione. (decerebrazione)	<b>2</b>
nessuna	<b>1</b>	

### RISULTATO

Grave, con GCS  $\leq 8$

Moderata, GCS 9-13

Minore, GCS  $\geq 14$ .